

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

## EDITION DE LA STATION "ALSACE ET LORRAINE"

(BAS-RHIN, HAUT-RHIN, MEURTHE-ET-MOSELLE, MEUSE, MOSELLE, VOSGES)

## SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Cité Administrative - 67084 STRASBOURG CEDEX

Tél. : (88) 36.24.87

ABONNEMENT ANNUEL 50 F

Régisseur de recettes D.D.A.

2, Rue des Mineurs

67070 STRASBOURG CEDEX

C. C. P. STRASBOURG 55-08-00 F

Bulletin n° 65

19 Août 1975

### ARBRES FRUITIERS

- POMMIER - POIRIER -

#### CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES

Les captures des papillons du deuxième vol se poursuivent dans nos postes de contrôle par piégeage sexuel.

Elles sont fortes dans la région de WISSEMBOURG alors qu'elles sont nettement plus faibles dans le sud de l'Alsace. Dans la région de ROTTELSHEIM, les captures de papillons sont devenues plus importantes à partir du 10 Août.

Si l'on note une variation assez notable des captures d'une région arboricole à l'autre, elles sont cependant suffisantes dans la majorité des cas pour estimer une population active dans les vergers justifiant le renouvellement du traitement insecticide.

On interviendra dans la période du 20 au 22 Août.

#### ARAIGNEES ROUGES

Nous rappelons que dans certains vergers de pommiers, notamment dans la région de WISSEMBOURG, l'on observe toujours des pullulations d'araignées rouges.

Il est absolument urgent de lutter contre ces générations estivales avec beaucoup de soin afin de limiter au maximum le dépôt des oeufs d'hiver, qui d'ailleurs est commencé.

Ce traitement pourra être combiné avec celui recommandé contre le carpocapse.

### CULTURES MARAICHIERES

- TOMATE -

#### MILDIOU

Si l'état sanitaire des tomates de plein air est satisfaisant en ce qui concerne le mildiou, les averses orageuses qui intéressent nos régions sont à même de déclencher une nouvelle série de contaminations.

La lutte contre le mildiou étant essentiellement préventive, avoir soin de renouveler la protection des cultures de plein air dans les meilleurs délais.

432

.../...

- CÉLERI -

SEPTORIOSE

Si l'humidité actuelle au niveau des cultures de céleri devait se maintenir, la septoriose pourrait se développer rapidement. Un nouveau traitement est conseillé sur variétés mi-hatives et tardives.

GRANDES CULTURES

- BETTERAVE INDUSTRIELLE -

NOCTUELLES DU FEUILLAGE

Dans la plupart des cultures, le feuillage des betteraves situées en bordure des parcelles est constellé de trous provoqués par les morsures de chenilles de noctuelles.

A moins d'attaques généralisées entraînant la destruction totale du feuillage, ces dégâts n'ont qu'une très faible incidence sur les rendements et ne justifient pas de traitement actuellement.

CERCOSPORIOSE

Le temps chaud et sec de la dernière quinzaine du mois de juillet et de la première décade du mois d'août n'a pas permis à la maladie de s'installer et de s'étendre sur les cultures.

N'ayant pas encore constaté de foyers de cercosporiose sur le secteur betteravier malgré les pluies orageuses de ces derniers jours, attendre un nouvel avis de la station pour éventuellement intervenir.

Les Ingénieurs chargés des  
Avertissements Agricoles :

C. GACHON  
J. GENNATAS  
C. JANUS

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie, Chef de la  
Circonscription Phytosanitaire  
"ALSACE et LORRAINE"

J. HARRANGER